

## Traitements UE6 - Maladies Infectieuses

| Sinusite bactérienne – Traitement probabiliste                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>ère</sup> intention : <u>aminopénicilline</u>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Amoxicilline</b> 7j</li><li>• <b>Amoxicilline-acide clavulanique</b> 7j</li></ul> |                                                                                                                                                     |
| Alternative si allergie aux pénicillines : <u>C2G orales</u>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Céfuroxime-axétil</b> 5j</li></ul>                                                |                                                                                                                                                     |
| Alternative si allergie aux pénicillines : <u>C3G orales</u>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cefpodoxime-proxétil</b> 5j</li><li>• <b>Céfotiam-héxétil</b> 5j</li></ul>        |                                                                                                                                                     |
| <u>Synergistine</u> (Si allergie aux pénicillines et aux céphalosporines) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pristinamycine</b> 4j</li></ul>                                                   |                                                                                                                                                     |
| <u>Fluoroquinolone anti-pneumococcique</u> (dernier recours)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lévofloxacine</b> 8j</li></ul>                                                    |                                                                                                                                                     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Angines                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Erythémato-pultacées SBHA                                                 | 1) <b>Amoxicilline</b> 6j<br>2) Céphalosprines : <ul style="list-style-type: none"><li>– C2G : <b>Céfuroxime-axétil</b> (adulte) 4j</li><li>– C3G : <b>Cefpodoxime</b> (enfant et adulte) 5j ou <b>Céfotiam</b> (adulte) 5j</li></ul> 3) Macrolides : <b>Azithromycine</b> 3j ou <b>Clarithromycine</b> 5j |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Angine pseudo-membraneuse - diphtérie                                     | <b>Amoxicilline</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Angine de Vincent                                                         | <b>Amoxicilline</b><br>2 <sup>ème</sup> intention : <b>métronidazole</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Otites Moyennes aiguës                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| 1 <sup>ère</sup> intention                                                | <b>Amxocilline +/- acide clavulanique</b> si H. influenzae                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| 2 <sup>ème</sup> intention                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Allergie aux pénicillines</i>                                                                                             | <i>CI aux BL</i>                                                                                                                                    |
|                                                                           | <i>Enfant (<math>\leq 2</math> ans =&gt; 8j ; &gt;2 ans =&gt; 5j)</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cefpodoxime</b></li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cotrimoxazole</b></li><li>• <b>Erythromycine-sulfafurazole</b></li><li>• <b>Pristinamycine</b></li></ul> |
|                                                                           | <i>Adulte 5j</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cefpodoxime</b></li><li>• <b>Céfuroxime-axétil</b></li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pristinamycine</b></li><li>• <b>Cotrimoxazole</b></li><li>• <b>Lévofloxacine</b></li></ul>               |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Méningites                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Méningocoque                                                              | C3G : <b>Ceftriaxone</b> ou <b>Cefotaxime</b> 4-7j                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Pneumocoque                                                               | C3G : <b>Ceftriaxone</b> ou <b>Cefotaxime</b> 10-14j                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| BGN                                                                       | C3G : <b>Ceftriaxone</b> ou <b>Cefotaxime</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Listeria                                                                  | <b>Amoxicilline + Gentamicine</b> 3 semaines<br>SI allergie : <b>cotrimoxazole</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Herpès                                                                    | <b>Aciclovir</b> IV 3 semaines                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |

| Endocardite Infectieuse                |                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Germes                                 |                                                           | Schéma                                                         | Alternative                                                                                                                                                                       | Durée                                              |
| Streptocoques                          | Se à pénicilline sur valve native et pas de complications | <b>Amoxicilline</b> ou <b>Ceftriaxone</b>                      | <b>Vancomycine</b>                                                                                                                                                                | 4 semaines                                         |
|                                        | Se à pénicilline sur prothèse ou complication             | <b>Amoxicilline</b> ou <b>Ceftriaxone</b> + <b>Gentamicine</b> | <b>Vancomycine</b> + <b>Gentamicine</b>                                                                                                                                           | Bithérapie 2 semaines puis 2-4 semaines monot      |
|                                        | Se diminuée à Pénicilline                                 | <b>Amoxicilline</b> ou <b>Ceftriaxone</b> + <b>Gentamicine</b> | <b>Vancomycine</b> + <b>Gentamicine</b>                                                                                                                                           | 2 semaines bithérapie puis 2 semaines monothérapie |
| Entérocoques                           | Sensibles aux BL                                          | <b>Amxocilline</b> + <b>gentamicine</b>                        | <b>Vancomycine</b> + <b>Gentamicine</b>                                                                                                                                           | 4-6 semaines dont 2 de bithérapie                  |
|                                        | Se aux BL et R à gentamicine                              | <b>Amoxicilline</b> + <b>Ceftriaxone</b>                       |                                                                                                                                                                                   | 6 semaines                                         |
| Streptocoques ou entérocoques R aux BL |                                                           | <b>Vancomycine</b> + <b>Gentamicine</b>                        |                                                                                                                                                                                   | 4-6 semaines                                       |
| Staphylocoques                         | Méti-S                                                    | <b>Oxacilline</b> + <b>Gentamicine</b> + <b>Rifampicine</b>    | <b>Cefazoline</b><br>OU <b>Vancomycine</b> + <b>Gentamicine</b> + <b>Rifampicine</b><br>OU <b>Daptomycine</b><br>OU <b>Sulfaméthoxazole/triméthopri me</b> /+ <b>clindamycine</b> | 4-6 semaines                                       |
|                                        | Méti-R                                                    | <b>Vancomycine</b> + <b>gentamicine</b> + <b>Rifampicine</b>   | <b>Daptomycine</b> + <b>Oxacilline</b> ou <b>fosfomycine</b>                                                                                                                      | 6 semaines                                         |
| Entérobactéries                        |                                                           | <b>Céfotaxime</b> + <b>gentamicine</b>                         |                                                                                                                                                                                   | 4-6 semaines                                       |
| Pseudomonas Aeruginosa                 |                                                           | <b>BL-antipyocyanique</b> + <b>Aminoside</b>                   |                                                                                                                                                                                   | 6 semaines                                         |
| C. burnetii                            |                                                           | <b>Doxycycline</b>                                             |                                                                                                                                                                                   | ≥ 3 mois                                           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | + Rifampicine<br>+ Cotrimoxazole                                                                                                       |                              |                                       |
| Brucella                                                                          |                                                                                                                                                                           | Doxycycline<br>+<br>hydrochloroquin<br>e ou ofloxacin<br>e                                                                             |                              | >18 mois                              |
| Bartonella spp                                                                    |                                                                                                                                                                           | Amoxicilline ou<br>ceftriaxone ou<br>doxycycline<br>+ gentamicine                                                                      |                              | 6 semaines<br>dont 3 de<br>bithérapie |
| Candida                                                                           |                                                                                                                                                                           | Amphotéricine B<br>+flucytosine                                                                                                        |                              | >>3mois                               |
| Tt probabiliste si<br>patient grave avec<br>valve native ou<br>prothèse > 12 mois |                                                                                                                                                                           | Amoxicilline<br>+ Oxacilline<br>+ Gentamicine                                                                                          | Vancomycine<br>+ Gentamicine |                                       |
| Tt probabiliste chez<br>patient grave avec<br>prothèse <12 mois                   |                                                                                                                                                                           | Vancomycine<br>+ Gentamicine<br>+ Rifampicine                                                                                          |                              |                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |                                       |
| Infections broncho-pulmonaires communautaires                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |                                       |
| Exacerbatio<br>n BPCO                                                             | Dyspnée d'effort<br>VEMS <50%                                                                                                                                             | Amoxicilline ou Macrolides ou Pristinamycine                                                                                           |                              |                                       |
|                                                                                   | Dyspnée de repos<br>VEMS < 30%                                                                                                                                            | Amxocilline/acide-clavulanique Ou C3G injectables<br>(cefotaxime ou ceftriaxone) ou FQAP<br>(lévofloxacin)                             |                              |                                       |
| PAC                                                                               | Ambulatoire                                                                                                                                                               | Amoxcilline ou Macrolides<br>Alternative : Pristinamycine                                                                              |                              |                                       |
|                                                                                   | Hospitalisation                                                                                                                                                           | Sujet jeune : amoxicilline ou macrolides<br>Sujet âgé : ou comorbidités : Amoxicilline/acide<br>clavulanique ou ceftriaxone/cefotaxime |                              |                                       |
|                                                                                   | Suspicion P.<br>aeruginosa                                                                                                                                                | BL antipyocyanique (céfépime, pipéracilline-<br>tazobactam ou imipénème)<br>+ amikacine ou tobramycine<br>+ macrolides ou lévofloxacin |                              |                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |                                       |
| Infections cutané-muqueuses et des phanères                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |                                       |
| Impétigo (Staph)                                                                  | Formes peu étendues : Pommade : acide fusidique ou mupirocine<br>5j<br>Formes étendues : ATB per os : amoxicilline/acide-clavulanique si<br>allergie : pristinamycine) 7j |                                                                                                                                        |                              |                                       |
| Folliculite (S.<br>aureus)                                                        | Formes profuses : amoxicilline/acide clavulanique (si allergie<br>pristinamycine)                                                                                         |                                                                                                                                        |                              |                                       |
| Furoncles à risque<br>de complications                                            | Amoxicilline/acide clavulanique (si allergie :<br>pristinamycine/clindamycine) 7j                                                                                         |                                                                                                                                        |                              |                                       |
| Furunculose                                                                       | ATBt anti-staphyloccocique per os 7j<br>Pommade : mupirocine                                                                                                              |                                                                                                                                        |                              |                                       |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intertrigo des grands plis (Candida)                        | Topiques : <b>amphotéricine B</b> ou <b>azolés</b>                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Périonyxis et onyxis (Candida)                              | Antifongique <b>azolé</b> : <b>fluconazole</b>                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Vulvo-vaginite (Candida)                                    | <b>Nystatine</b> ou <b>azolés</b> en ovules<br>Si échec : <b>fluconazole</b> per os                                                         |                                                                                                                                         |
| Balanite et balano-prostatite (Candida)                     | <b>Dérivés azolés</b> 1 semaine<br>Si échec : <b>fluconazole</b>                                                                            |                                                                                                                                         |
| Candidose buccale                                           | Tt local : <b>amphotéricine B</b> ou <b>nystatne</b> ou <b>miconazole</b><br>Si formes profuses/résistantes/ID : <b>azolé (flucanazole)</b> |                                                                                                                                         |
| Pityriasis versicolor (Malassezia furfur)                   | Gel moussant <b>kétoconazole</b>                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Dermite séborrhéique (Malassezia furfur)                    | Gel moussant <b>kétoconazole</b> ou <b>ciclopiroxolamine</b>                                                                                |                                                                                                                                         |
| Intertrigo des petits plis (dermatophytes)                  | Azolés locaux                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Intertrigo des grands plis (dermatophytes)                  | <b>Azolés</b> locaux ou <b>terbinafine</b>                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Onychomycose                                                | +/- <b>terbinafine</b> orale                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| Dermatophytie cutanée                                       | <b>Azolé</b> local                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Teignes tondantes                                           | Tt local par dérivé <b>azolé</b> ou <b>ciclopiroxolamine</b> + Tt oral <b>griséofulvine</b>                                                 |                                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| <b>Dermo-hypodermite infectieuse bactérienne nécrosante</b> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
|                                                             | <i>1<sup>ère</sup> ligne</i>                                                                                                                | <i>Alternative</i>                                                                                                                      |
| DHBN communautaire des membres et cervicofaciales           | <b>Amoxicilline-acide clavulanique</b> 2g 3x/j<br>+ <b>Clindamycine</b> 600mg 4x/j<br>+ <b>Gentamicine</b> 5-7mg/kg/j                       | <b>Céfotaxime</b> 2g 3x/j<br>+ <b>Métronidazole</b> 500mg 3x/j<br>+ <b>Clindamycine</b> 600mg 3-4x/j<br>+ <b>Gentamicine</b> 5-7mg/kg/j |
| DHBN communautaire périnéale ou abdominale                  | <b>Pipéracilline-Tazobactam</b> 4g, 4x/j<br>+ <b>Gentamicine</b> 5-7mg /kg/j                                                                | <b>Imipenem</b> 1g 3x/j<br>+ <b>Gentamicine</b> 5-7mg/kg/j                                                                              |
| DHBN post-opératoire ou nosocomiale                         | <b>Pipéracilline-Tazobactam</b> 4g, 4x/j<br>+ <b>Amikacine</b> 20-30mg/kg/j                                                                 | <b>Imipenem</b> 1g 3x/j<br>+ <b>Amikacine</b> 20-30mg/kg/j                                                                              |
| Supicion SARM                                               | <b>Vancomycine</b> ou <b>linézolide</b> ou <b>daptomycine</b> ou <b>céftaroline</b>                                                         |                                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |

| Septicémie et bactériémie           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Traitements probabilistes           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                               |
|                                     | Examen direct                                                                                                                                                                              | 1 <sup>ère</sup> ligne                                                                                                 | Alternative                                   |
| Bactériémies communautaires         | Coques G+ en amas                                                                                                                                                                          | <b>Pénicilline M</b> ou <b>céfazoline</b> + <b>vancomycine</b> +/- <b>Gentamicine</b>                                  |                                               |
|                                     | Coques G+ en chainettes                                                                                                                                                                    | <b>Amoxicilline</b> ou <b>C3G</b> (ceftriaxone, cefotaxime)                                                            |                                               |
|                                     | BGN                                                                                                                                                                                        | <b>C3G</b> (cefotaxime ou ceftriaxone) +/- <b>gentamicine</b>                                                          | <b>Fluoroquinolone</b> +/- <b>gentamicine</b> |
| Bactériémies associées aux soins    | Coques G+                                                                                                                                                                                  | <b>Vancomycine</b>                                                                                                     | <b>Daptomycine</b> + <b>gentamicine</b>       |
|                                     | BGN                                                                                                                                                                                        | <b>Urédopénicilline</b> + inhibiteurs de <b>BLactamase</b> ou <b>céfépime</b> ou <b>carbapénème</b> + <b>amikacine</b> |                                               |
|                                     | Levure                                                                                                                                                                                     | <b>Echinocandine</b>                                                                                                   | <b>Amphotéricine BI</b> iposomale             |
| Traitements selon l'agent pathogène |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                               |
| Staphylocoques méthi-S              | <b>Pénicilline M</b> +/- <b>aminoside</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | <b>Céfazoline</b> +/- <b>aminoside</b>        |
| Staphylocoques méthi-R              | <b>Vancomycine</b> +/- <b>aminoside</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | <b>Daptomycine</b> +/- <b>aminoside</b>       |
| Pneumocoque                         | <b>Amoxicilline</b> ou <b>C3G</b> (ceftriaxone, cefotaxime)                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                               |
| Streptocoque                        | <b>Amoxicilline</b> ou <b>C3G</b> (ceftriaxone, cefotaxime)                                                                                                                                |                                                                                                                        | <b>Vancomycine</b>                            |
| Entérocoque                         | <b>Amoxicilline</b> +/- <b>gentamicine</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | <b>Vancomycine</b> +/- <b>gentamicine</b>     |
| Entérobactéries                     | <b>C3G</b> (cefotaxime, ceftriaxone) +/- <b>aminoside</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                        | <b>Fluoroquinolone</b> +/- <b>aminoside</b>   |
| Entérobactéries R aux C3G           | <b>Carbapénème</b> ou <b>céfépime</b> +/- <b>aminoside</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                               |
| Pseudomonas aeruginosa              | <b>Urédopénicilline</b> + inhibiteur de <b>BLactamase</b> ou <b>ceftazidime</b> ou <b>céfépime</b> ou <b>carbapénèmes</b> + <b>aminoside</b> ( <b>amikacine</b> ) ou <b>ciprofloxacine</b> |                                                                                                                        |                                               |
| Candida spp                         | <b>Fluconazole</b><br>Si échec : <b>échinocandine</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                               |

| Tuberculose            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>ère</sup> ligne | Ethambutol, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 <sup>nde</sup> ligne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aminosides : streptomycine, amikacine</li><li>• Capréomycine</li><li>• Fluroroquinolones : moxifloxacine, lévofloxacine</li><li>• Ethionamide</li><li>• Acide para-amino salycyclique</li><li>• Cyclosérine</li><li>• Linézolide</li><li>• Bedaquiline</li><li>• Délamanide</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Infections urinaires   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cystite                | Simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) <b>Fosfomycine-trométamol</b> (dose unique)<br>2) <b>Pivmécillinam</b> 5j<br>3) <b>Fluoroquinolone</b> DU (Ciprofloxacine ou ofloxacine)<br><b>OU Nitrofurantoïne</b> 5j                                                                      |
|                        | A risque de complications                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Traitement ne pouvant être différé :<br>1) <b>Nitrofurantoïne</b><br>2) <b>Céfixime</b> ou <b>Fluoroquinolone</b><br>Sinon, adaptation à l’ATBg                                                                                                  |
|                        | Récidivante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) <b>Fosfomycine-trométamol</b> (dose unique)<br>2) <b>Pivmécillinam</b> 5j<br>3) <b>Fluoroquinolone</b> DU (Ciprofloxacine ou ofloxacine)<br>Si au moins 1 épisode/ mois, discuter ATBp : <b>triméthoprim</b> ou <b>fosfomycine-trométamol</b> |
| Pylénonéphrite aigüe   | Simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) <b>Fluoroquinolone</b> OU <b>C3G parentérale</b><br>2) Si allergie : <b>aminoside</b> ou <b>azthréonam</b>                                                                                                                                    |
|                        | Facteurs de risque de complication                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – <b>C3G parentérale</b> ou <b>FQAP</b><br>– Si allergie <b>aminoside</b> ou <b>azthréonam</b>                                                                                                                                                   |
|                        | Grave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabiliste :<br>- <b>C3G + amikacine</b><br>- Si sepsis grave ou geste urologique ET (ATCD d’IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les 6 mois) : <b>carbapénème + amikacine</b>                                                             |

|                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si choc septique ET (IU ou colonisation EBLSE ou ATBt dans les 6 mois ou voyage en zone endémique ou h° &lt; 3 mois ou vie en établissement de long séjour) :<br/><b>carbapénème + amikacine</b></li> <li>- Si allergie : <b>aztréonam + amikacine</b></li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Infection urinaire masculine / prostatite                                                         |                | <u>Probabiliste</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepsis grave, choc septique, indication de drainage =&gt; <b>C3G + amikacine</b></li> <li>- Rétention ou ID profonde =&gt; <b>C3G parentérale</b> ou <b>FQAP</b></li> <li>- Fièvre ou mauvaise tolérance : <b>C3G parentérale</b> ou <b>FQAP</b></li> <li>- Autres =&gt; ATBg</li> </ul> <u>En relais</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fluoroquinolones</b> et <b>cotrimoxazole 14j</b></li> </ul> |
|                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Infections sexuellement transmissibles</b>                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HSV                                                                                               |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valaciclovir</b> ou</li> <li>• <b>Famciclovir</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Syphilis                                                                                          |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pénicilline G</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 injection si précoce</li> <li>- 5 si tardive</li> </ul> </li> <li>• Si allergie : <b>doxycycline</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chancre mou (Haemophilus ducreyi)                                                                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ceftriaxone</b> ou <b>Azithromycine</b> DU</li> <li>• OU <b>Erythromycine</b> 7j</li> <li>• OU <b>Ciprofloxacin</b> 5j</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lymphogranulomatose vénérienne                                                                    |                | <b>Doxycycline</b> 3 semaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Urétrite / orchi-épididymite / Vaginite / cervicite                                               | N. gonorrhea   | <b>1) Ceftriaxone</b> DU<br><b>2) Gentamicine, cefixime, ciprofloxacin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   | C. trachomatis | <b>Azithromycine</b> DU ou <b>Doxycycline</b> 7j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                   | M. genitalium  | <b>Azithromycine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Infections hautes : salpingite, endométrite                                                       |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doxycycline + métronidazole</b> 14j</li> <li>• Ou <b>Ceftriaxone</b> DU</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Coqueluche</b>                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) Macrolides : <b>clarithromycine</b> ou <b>Azithromycine</b><br>2) Si CI : <b>Cotrimoxazole</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Grippe                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Oseltamivir</li><li>• Zanamivir</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Hépatites virales                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| VHB                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interférons pégylés <math>\alpha 2a</math> et <math>\alpha 2b</math></li><li>• Analogues nucléosidique (<b>entécavir</b>) ou nucléotidique (<b>ténofovir</b>)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| VHC                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ribavirine</li><li>▪ Antiviraux d'action directe:<ul style="list-style-type: none"><li>◇ <b>Inhibiteurs protéase NS3/4A</b> = paritaprévir/ritonavir, grazoprévir, voxilaprévir, glecaprévir</li><li>◇ <b>Inhibiteurs NS5A</b> : daclatasvir, lédipasvir, ombitasvir, elbasvir, velpatasvir, pibrentasvir</li><li>◇ <b>Inhibiteurs NS5B</b> : sofosbuvir, dasabuvir</li></ul></li></ul> |                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Infections à herpès virus                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| HSV1                                                                              | Gingivostomatite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Valaciclovir</b><br>Si prise orale impossible : <b>Aciclovir</b> |
|                                                                                   | Kératite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Aciclovir</b>                                                    |
| HSV2                                                                              | <b>Valaciclovir</b> ou <b>Famciclovir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| Varicelle                                                                         | Formes graves : <b>Aciclovir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| Zona                                                                              | <b>Valaciclovir</b> ou <b>Famciclovir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| VIH                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <i>Inhibiteurs transcriptase inverse (INTI ou INNI)</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Nucléosidiques                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Lamivudine</b>                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Emtricitabine</b>                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Abacavir</b>                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tenofovir</b>                                                    |
| Non nuléosidiques                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nevirapine</b>                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Etavirine</b>                                                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rilpivirine</b>                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <i>Inhibiteurs protéase (IP)</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>Atazanavir/ ritonavir</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>Darunavir / ritonavir</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <i>Inhibiteurs intégrase (II)</i>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>Raltegravir</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>Dolutegravir</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>Elvitegravir</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <i>Inhibiteurs du corécepteur CCR5</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| <b>Maraviroc</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Paludisme                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| P. falciparum<br>P. knowlesi                                                      | <u>Forme non compliquée, pas de vomissements :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>1) <b>Arthémeter-luméfantine</b> ou <b>Arténimol-pipéraquine</b></li><li>2) <b>Atovaquone-proguanil</b></li><li>3) <b>Quinine</b></li></ul> <u>Forme non compliquée + vomissements :</u>                                                                                                                                               |                                                                     |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Quinine IV</b></li> </ul> <u>Paludisme grave :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Artésunate IV</b></li> <li>– Si forte suspicion de résistance : <b>quinine + doxycycline</b></li> </ul> <u>Chez l'enfant :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Arthémeter-lumafanrine, dihydrartémisinine-pipéraquine</b></li> <li>2) <b>Méfloquine</b> ou <b>atovaquone-proguanil</b></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Palu grave : <b>Artésunate IV</b></li> </ul> <u>Chez la femme enceinte :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ <i>Palu non compliqué</i> : <b>quinine</b> ou <b>atovaquone-proguanil</b> au T1 puis <b>artémether-luméfatrine</b> à partir T2</li> <li>◇ <i>Palu grave</i> : <b>artésunate IV</b></li> </ul> |
| P. vivax<br>P. ovale<br>P. malarie                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Si pas de vomissements</u> : <b>chloroquine</b> ou <b>ACT</b></li> <li>▪ <u>Si vomissements</u> : <b>quinine IV</b></li> </ul> <u>Si 1<sup>er</sup> accès de palu à P. vivax ou P. ovale</u> : <b>primaquine</b> en ATU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gale et pédiculose</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gale</b>                                                                                                                                                | <b>Pédiculose</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ivermectine 7j</b></li> <li>+ <b>Scabicides</b> classiques (<b>benzoate de benzyle</b>) = Tt local.</li> </ul> | <u>Pédiculose corporelle :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pédiculicides : <b>pyréthroïdes</b></li> </ul> <u>Pédiculose du cuir chevelu :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Insecticide : <b>malathion</b></li> <li>▪ Tt physique : <b>dimeticone</b></li> </ul> <u>Phtirose pubienne :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pyréthroïde</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Parasitoses digestives</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Amoebiose</b>                                                                                                                                           | <u>Amoebiose intestinale :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amoebicide tissulaire : <b>métronidazole 7j</b></li> <li>▪ Amoebicide de contact : <b>hydroquinoléine (tiliquinol) 10j</b></li> </ul> <u>Amoebiose hépatique :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amoebicide tissulaire : <b>métronidazole 10-14j</b></li> <li>▪ Puis cure amoebicide de contact (<b>tiliquinol</b>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Giardiose</b>                                                                                                                                           | <b>Métronidazole 15j</b> (alternative : <b>albendazole</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Taeniose</b>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Taeniose : <b>praziquantel</b> ou <b>niclosamide</b> ou <b>albendazole</b></li> <li>▪ Neurocysticercose : <b>corticothérapie + albendazole</b> (1-4 sem) ou <b>praziquantel</b> (2-4 sem)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ascaridiose</b>                                                                                                                                         | <b>Albendazole</b> ou <b>flubendazole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oxyurose</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Zoonoses                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brucellose                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Doxycycline + rifampicine</b></li> <li>▪ Ou <b>Doxycycline + aminoside</b></li> </ul>                                                                                                          |
| Fièvre Q                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forme aigüe : <b>Doxycycline</b> 2-3 semaines</li> <li>▪ Endocardite et infections vasculaires : <b>doxycycline +hydroxychloroquine</b> (si infection persistante localisée)</li> </ul>           |
| Leishmaniose                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cutanée : Tt local (<b>antimoniés, cryothérapie...</b>)</li> <li>▪ Muqueuse ou viscérale : Tt systémique (<b>amphotéricine B liposomale</b>)</li> </ul>                                           |
| Toxoplasmose                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si ID : <b>Pyriméthamine-sulfadiazine + acide folinique</b> 6 semaines</li> <li>▪ Femme enceinte PI : <b>spiramycine</b></li> </ul>                                                               |
| Borreliose de Lyme           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Phase primaire</u> : <b>amoxicilline</b> 14-21j ou <b>doxycycline</b> 14-21j</li> <li>▪ <u>Phases secondaire et tertiaire</u> : <b>ceftriaxone</b> 21-28j ou <b>doxycycline</b> 28j</li> </ul> |
| Maladies des griffes du chat | <b>Azithromycine</b> 5j                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasteurellose                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prophylaxie post-morsure : <b>Amoxicilline – acide clavulanique</b></li> <li>▪ <b>Amoxicilline</b></li> <li>▪ Si allergie : <b>céphalosporines</b> ou <b>doxycycline</b></li> </ul>               |
| Rickettsiose                 | <b>Doxycycline</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Tularémie                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Doxycycline + aminoside</b></li> <li>▪ Ou <b>ciprofloxacine + aminoside</b></li> </ul>                                                                                                         |
| Hydatidose                   | <b>Albendazole</b>                                                                                                                                                                                                                         |